

# CANCERUL DE COL UTERIN

## (fișă informativă pentru femei)



Cancerul de col uterin apare mai frecvent la femeile active sexual în vârstă de peste 30 de ani.

Aproape toate cancerurile de col uterin sunt cauzate de virusul papilloma uman (HPV). Acest virus se transmite pe cale sexuală.

### Principali factorii de risc:

- viața sexuală timpurie;
- schimbarea frecventă a partenerilor sexuali;
- infecțiile transmise pe cale sexuală
- virus al papilomatozei umane (VPU);
- nerespectarea igienei organelor genitale;
- avorturile numeroase;
- consumul de tutun și consumul nociv de alcool;
- supraponderabilitatea

### IMPORTANT:

**Depistat la timp, cancerul de col poate fi tratat**

- În faza incipientă cancerul de col uterin nu prezintă simptome.
- În stadiile avansate apar secreții și sângerări vaginale anormale, dureri.

### Măsurile de prevenire:

- Vaccinarea este cea mai sigură metodă de prevenire a cancerului de col uterin;
- Folosirea corectă și la fiecare contact sexual a prezervativului împiedică răspândirea virusului;
- Examinarea ginecologică periodică.
- Respectarea unui mod de viață sănătos.



Material informațional elaborat în cadrul Săptămânii Europene de prevenire a cancerului de col uterin